



Fluxofenim 960 g/l

Protector de cultivo

Concentrado Emulsionable.

Firma registrante: LA FORJA S.A.
Ruta Nacional 101, Km 24,500
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815 / Fax: 598 2 683 8626
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

Contenido Neto: 100 cc
Origen: China
DGSSAA REG N° 4419

LEA LA ETIQUETA

VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO

DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Acetoanilidas.

Instrucciones de almacenamiento:

Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Flex es un protector de cultivo recomendado para el uso de herbicidas en base a metolaclor y acetoclor en el cultivo de sorgo. Flex se aplica a la semilla previo a la siembra y actúa estimulando la actividad enzimática y promoviendo la degradación del herbicida, protegiendo así al cultivo de sorgo. Fluxofenim es efectivo tanto para su utilización en sorgos graníferos como sorgos forrajeros y sileros.

Instrucciones de uso:

Cultivo	Dosis
Sorgo	40 cc cada 100 kg. de semilla.

Momento(s) de aplicación: Se aplica sobre la semilla previo a la siembra. Aplicar siempre sobre semillas de alta calidad y buena germinación. Evitar el tratamiento de semilla de baja calidad ya que puede afectar la germinación de la semilla a tratar.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Una dosis en la semilla antes de sembrar. No repetir el tratamiento sobre semilla ya tratada.

Compatibilidad y fitotoxicidad:

Compatible con curasemillas de uso común para el tratamiento de semilla de sorgo a excepción de aquellas formulaciones que contengan solventes orgánicos. Cuando se apliquen fungicidas y/o insecticidas aplicar primero estos productos y luego aplicar Fluxofenim a la dosis recomendada. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala. No ha mostrado síntomas de fitotoxicidad siempre que sea utilizado conforme las especificaciones de esta etiqueta.

Tiempo de espera: No corresponde por su modo de empleo.

Tiempo de reingreso al cultivo:

No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación:

Diluir la dosis a utilizar en 0,7 litros de agua y tratar con esta solución 100 kg. de semilla de sorgo. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Método de aplicación:

Aplicar mediante utilización de maquinaria apropiada para el tratamiento de semillas: hormigonera, tambor excéntrico y/o curadoras específicas. Introducir la cantidad de semilla a



tratar y agregue la dosis de producto a utilizar. Mezclar mediante rotación de los equipos detallados anteriormente. Para lograr una buena protección del cultivo se requiere de una distribución homogénea y uniforme de la totalidad de la semilla tratada.

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO inducir el vómito.

En caso de contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla. En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso.
Fabricante: Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: Muy tóxico. Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Por su forma de aplicación no reviste peligro para las abejas.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de acopio más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca USO AGRICOLA LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.



TAFIREL
COMPAÑIA DE AGROQUÍMICOS

Empresa Certificada.
ISO 9001:2008 LSQA N°: 1559/01 IQnet N°: 13553/0

NOCIVO

Clase II MODERADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009

