

TEBUZATE 43 SC

Firma registrante:
La Forja S.A.
Ruta Nacional 101,
km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com

Empresa Certificada.
ISO 9001:2008
LSQA N°: 1559/01
IQNet N°: 13553/0

Tebuconazol 430gr/lt
Fungicida - Suspensión Concentrada

CONTENIDO NETO 5 LTR
Fecha de Vto.: 31/10/2018
N° de lote: 31102018
Origen: China
DGSSAA REG N° 3002



TAFIREL

Ingrediente activo: Triazol

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, protegido de la luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacén de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros productos similares. El local debe estar claramente señalizado.

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: TEBUZATE 43 SC es un fungicida sistémico de acción preventiva, curativa y en algunos casos erradicante. Perteneciente al grupo de los triazoles, los cuales se caracterizan por inhibir en los hongos la síntesis del ergosterol.

Instrucciones de uso:

Cultivo o sitio de aplicación	Enfermedad		Dosis lts/ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
Arroz	Podredumbre del tallo	Sclerotium oryzae	0.5 a 0.7
	Mancha lineal	Cercospora oryzae	
	Manchado confluyente	Rhizoctonia oryzae	
	Bruzzone	Pyricularia oryzae	
Soja	Roya	Phakopsora pachyrhizi	0.25 a 0.35
Arándanos	Roya	Pucciniastrum vaccinii	25 cc/100Lts.
Trigo y Cebada	Drechslera	Drechslera tritici	0.35 a 0.45
	Septoriosis	Septoria Tritici	
	Fusarium	Fusariumsp.	

Momento de aplicación: Arroz: Bruzzone. Al hinchar la espiga y a la emergencia de la panoja. Para el resto de las enfermedades a la emergencia de la panoja y 15 días después, combinado con Carbenazate. Soja: Realizar evaluaciones periódicas del cultivo para detectar la aparición de pustulas. Confirmada su presencia, realizar la aplicación. Monitorear los cultivos. En caso de detectarse la presencia de roya en cultivos vecinos o a nivel zonal, aplicar preventivamente a partir de fin de floración (R3). Se sugiere consultar el Programa Nacional de Vigilancia para obtener información complementaria a nivel zonal. Arándanos: Desde aparición de síntomas hasta 5 días antes de cosecha.

Frecuencia de aplicaciones: En caso de alto nivel de infección puede repetirse el tratamiento.

Compatibilidad y fitotoxicidad: Es compatible con la mayoría de los fungicidas y pesticidas. Cuando no se conozca la compatibilidad o la fitocompatibilidad con otros fitosanitarios, antes de su aplicación, efectuar una prueba a pequeña escala con los productos que se combinará para conocer la compatibilidad y la fitocompatibilidad de la mezcla que se efectúe.

Tiempo de espera: Arroz: 35 días; Trigo: 32 días; Maíz y Cebada: 7 días; Tomate: 7 días; Soja: 20 días.

Tiempo de reintegro al cultivo: No entrar al cultivo hasta que se haya secado el depósito del producto aplicado.

Otras informaciones NECESARIAS respecto al uso: Cuando fungicidas de un mismo modo de acción, son usados repetidamente en las mismas zonas o sobre el mismo cultivo, puede producirse la aparición de biotipos resistentes, que logran sobrevivir, propagarse y volverse dominantes en dicha zona o cultivo. Alternar o combinar la aplicación de este producto con fungicidas de diferente modo de acción, pueden evitar o demorar la aparición o el desarrollo de resistencia.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Con el equipo agitador en marcha agregar la cantidad requerida de TEBUZATE 43 SC y mezclar bien. Si se han de aplicar otros fitosanitarios,

prepararlos y mezclarlos bien antes de movimiento durante la preparación y hasta finalizar la aplicación. TEBUZATE 43 SC se aplica con los equipos de uso frecuente, pulverizadores o atomizadores, manuales o de tractor, siempre con agitadores, de alto o bajo volumen, siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. Las dosis por 100 L especificadas para aplicación directa al cultivo se refieren a dosis del producto para aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y del límite del predio de centros educativos. Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). **Precauciones y advertencias:** Clasificación Toxicológica: Clase III (tres). Producto ligeramente peligroso. IPCS/OMS, 2009. **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavar con agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar, daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados del producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos, peces, aves y abejas:** Aves y abejas: Ligeramente tóxico. Peces: Moderadamente tóxico. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego referir el envase para evitar su reutilización. Traslado los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CÍATA TELEF. (0 22) 200 0000 O LLAMAR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. **USO AGRIICOLA:** LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenamiento, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: TRUSTSCHEM CO., LTD

CUIDADO
CLASE III LIGERAMENTE PELIGROSO
IPCS/OMS 2009

