

Firma registrante: LA FORJA S.A.
Ruta Nacional 101, Km 24,500
Canelones Uruguay.

Tel.: 598 2 683 8815 / Fax: 598 2 683 8626
www.tafirel.com tafirel@tafirel.com

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo:
Diamida entránfila.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, sin luz solar directa, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: CINATRA 80 WDG, es un insecticida para el control de plagas en el cultivo de soja. Actúa como antagonista (activador) de los receptores de rianodina de los insectos, lo que afecta el proceso de contracción muscular. Los insectos presentan parálisis, dejan de comer rápidamente y mueren en los pocos días. Afecta todos los estadios de madurez de los insectos, impactando a nivel de huevos, larvas o ninfas y adultos. Al ser aplicado al inicio de los ataques afecta a las plagas de manera integral, manteniendo las poblaciones por debajo del umbral. No afecta a las poblaciones de enemigos naturales.

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (gr/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico	
Soja	Lagarta de la soja	Anticarsia gemmatilis	10 - 13
	Lagarta del girasol	Rachiplusia nu Pseudoplusia includens	
	Lagarta cogollera	Spodoptera frugiperda	16 - 20
	Lagarta bollera	Helicoverpa armigera	
	Chinche verde	Nezara viridula	
Chinche de las leguminosas	Piezodorus guildinii	16 - 20	
Chinche marrón de la soja	Dichelops furcatus		
Chinche meona	Edessa meditabunda		
Maíz	Lagarta cogollera	Spodoptera frugiperda	10 - 13
Tomate	Mosca blanca de los invernáculos	Trialeurodes vaporariorum	50 - 100
	Mosca blanca	Bemisia tabaci	

Momento(s) de aplicación: Las aplicaciones deben ser planificadas por medio de monitoreo de los cultivos, teniendo en cuenta los niveles poblacionales de las plagas y los umbrales de daño y/o de acuerdo a las alarmas zonales.

Número de aplicaciones: Se pueden repetir las aplicaciones dependiendo de la dosis utilizada y de la presión de la plaga.

Compatibilidad y fitotoxicidad: En caso de mezclar con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitocompatibilidad en pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. **Tiempo de espera:** Soja: 28 días. Maíz: No determinado debido a su modo de empleo. Tomate: 1 día. Fuente: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA, Brasil).

CINATRA

80 WDG

Cyantranilprole 80 %
Insecticida - Gránulos Dispersables



TAFIREL

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Llenar con agua limpia el tanque de la máquina pulverizadora hasta la mitad de su capacidad con el agitador en marcha o retorno en marcha, agregar la dosis a emplear de CINATRA 80. Completar el llenado del tanque con la cantidad de agua necesaria. Puede ser aplicado con equipos terrestres o aéreos. Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y

Empresa Certificada.
ISO 9001:2008
LSQA N°: 1559/01
IQNet N°: 13553/0

CONTENIDO NETO 200 grs
Fecha de Vto.: 03/03/2020
N° de Lote: 03032020
Origin: China
DGSSAA REG N°

centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo y a una distancia inferior a 300 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión, inhalación, NO provocar el vómito. No existe tratamiento específico. Aplicar tratamiento sintomático. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de usarla. En caso de contacto ocular, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: Moderadamente tóxica. Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

Disposición final de envases: Una vez lavado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase para evitar su reutilización como tal. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 21722. CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.** Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca **USO AGRICOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.**

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera del su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: Trustchem Co., Ltd.



CUIDADO
LIGERAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009.

