


Herbex

Metsulfuron metil 60%
Herbicida - Polvo mojable

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS:

HERBEX 60 WP, es un herbicida selectivo de acción sistémica que controla malezas de hoja ancha en cultivo de trigo, cebada, arroz y avena en post emergencia. Gracias a la aplicación en estadios tempranos y debido a su alta residualidad logra eliminar las malezas en forma prematura.

VENTAJAS:

- ✓ ALTA RESIDUALIDAD
- ✓ AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN PARA MALEZAS DE HOJA ANCHA
- ✓ MUY ALTA ACTIVIDAD HERBICIDA A DOSIS BAJA POR HECTÁREA



Herbex

PRINCIPIO ACTIVO: METSULFURON METIL 60%

FORMULACIÓN: POLVO MOJABLE

GRUPO QUÍMICO: SULFONILUREA

MODO DE ACCIÓN:

Es absorbido por hojas y raíces. Su modo de acción es inhibir la enzima acetolactato sintetasa (ALS). Se bloquea de esta manera la división celular y el crecimiento de las malezas susceptibles. Los síntomas son la detención inmediata del crecimiento, amarillamiento y necrosis de 1 a 3 semanas luego del tratamiento.

INFORMACION EXTRA:

No aplicar más de 10 g/ha/año

No mezclar con insecticidas organofosforados, ni tampoco aplicar este tipo de insecticidas 14 días antes o después ya que reduce su selectividad y puede generar fitotoxicidad.

En situaciones de estrés, como puede ser frío, exceso de precipitaciones o heladas, se puede generar fitotoxicidad. En estos casos recomendamos aplicar junto con **Tecamin Max**

TIEMPO DE ESPERA: 30 días

CUADRO DE USOS

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (g/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
TRIGO (<i>Triticum aestivum</i> L.)	Biznaguilla Biznaga Calabacilla Caapiquí	<i>Ammi majus</i> <i>Ammi visnaga</i> <i>Silene gallica</i> <i>Stellaria media</i>	5-6*
CAÑA DE AZÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i> L.)	Cardo de Castilla Cardo negro Flor morada Lengua de vaca Manzanilla Mastuerzo Mostacilla Nabo silvestre Rábano	<i>Cynara cardunculus</i> <i>Cirsium vulgare</i> <i>Echium plantagineum</i> <i>Rumex crispus</i> <i>Anthemis cotula</i> <i>Coronopus didymus</i> <i>Rapistrum rugosum</i> <i>Brassica campestris</i>	6-7**
ARROZ (<i>Oryza sativa</i> L.)	Yuyo colorado	<i>Raphanus raphanistrum</i> <i>Amaranthus quitensis</i>	5-7***

* A partir de Z 1.3 (3 hojas) a Z 2.1 (inicio de macollaje)

** Aplicar en macollaje

*** Aplicar luego de la emergencia de un 70% de plantas de arroz y hasta no mas de **30 días** post emergencia. Malezas en estados de plántulas hasta 30 cm de altura.

En mezclas utilizar **4 - 5 g/ha**

HyodexMax Gramanex CYPEREX
75 WDG

