MCPA 75 TAFIREL

MCPA, sal Dimetilamina 940 g/L. Equivalente en MCPA 750 g/L
Herbicida - Concentrado Soluble

FICHA TÉCNICA





CARACTERÍSTICAS:

MCPA 75 TAFIREL, es un herbicida hormonal, con efecto post emergente de traslocación. Controla selectivamente malezas de hoja ancha en cereales (solos y/o asociados con trébol rojo), maíz, sorgo, arroz, gramíneas forrajeras, frutales y vid.

VENTAJAS:

- GRAN CONTROL DE MALEZAS DE HOJA ANCHA
- DESTACADA SISTEMIA
- EXCELENTE SINGERGISMO EN MEZCLA CON OTROS HERBICIDAS HORMONALES: PYCLOREX, DICAMBEX SL y FLUROXYPYR TAFIREL

LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE
ISO 45001:2018 REG: SST 29416 /01

TAFIREL

MCPA 75 TAFIREL

PRINCIPIO ACTIVO: MCPA, SAL DIMETILAMINA 940 g/L.
EQUIVALENTE EN MCPA 750 g/L
FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE
GRUPO QUÍMICO: ÁCIDO FENOXIACÉTICO

MODO DE ACCIÓN:

Pertenece al Grupo HRAC 0 - Mimético de las auxinas. Se absorbe por hojas y se trasloca a las regiones meristemáticas donde inhibe el crecimiento de las mismas.

INFORMACION EXTRA:

Excelente compatibilidad con otros hormonales

Su efecto mejora con temperaturas templadas y buena humedad en el suelo

No aplicar en cultivos en condiciones de estrés por sequía o heladas

Puede dañar cultivos sensibles como vid y frutales si existe deriva durante la aplicación

MOMENTO DE APLICACIÓN:

CEREALES: Aplicar desde Z2.1 (inicio de macollaje) a Z 3.0 (inicio de encañado).

CEREALES CONSOCIADOS: Aplicar cuando el trébol tenga más de 3 hojas trifoliadas y cereales entre Z 1.5 y Z 3.0.

GRAMÍNEAS FORRAJERAS: Aplicar con malezas poco desarrolladas, gramíneas macolladas y trébol más de 3 hojas trifoliadas

MAÍZ y SORGO: A partir de que el cultivo tenga 20 cm de altura y hasta comienzos de floración

FRUTALES: Mayores a 3 años de edad. Para control de corrihuela aplicar antes de que esta florezca, evitando mojar follaje o los brotes basales de los árboles.

CUADRO DE USOS

Cultivo o sitio de aplicación	Plaga		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
TRIGO *(Triticum aestivum L.)* **CEBADA** *(Hordeum Vulgare L.)* **AVENA** *(Avena Sativa L.)* **CENTENO** *(Secale cereale L.)*	**Cardo de Castilla**	*Cynara cardunculus*	**0.7 - 1**
CEREALES CONSOCIADOS **TRIGO + TRÉBOL ROJO** **CEBADA + TRÉBOL ROJO** **AVENA + TRÉBOL ROJO**	**Cepa caballo**	*Xanthium spinosum*	**0.35 - 0.45**
	Biznaguilla	*Ammi majus*	
	Corrihuela	*Convolvulus arvensis*	
	Flor morada	*Echium plantagineum*	
	Lengua de vaca	*Rumex crispus*	
	Mastuerzo	*Coronopus didymus*	
FESTUCA *(Festuca arundinacea)* **RAIGRÁS ANUAL** *(Lolium multiflorum)*	**Mostacilla**	*Rapistrum rugosum*	**0.35 - 0.45**
	Nabo silvestre	*Brassica campestris*	
MAÍZ *(Zea mays L.)* **SORGO** *(Sorghum bicolor L.)*	**Ortiga**	*Urtica urens*	**0.8 - 1.3**
	Quinoa	*Chenopodium album*	
FILAS Y ENTREFILAS **DURAZNO** **LIMÓN** **MANDARINA** **MANZANA** **NARANJA** **POMELO** **UVA**	**Verdolaga**	*Portulaca oleracea*	**1**
	Yuyo colorado	*Amaranthus quitensis*	

TIEMPO DE ESPERA: 30 días