


# PRONTO

Herbicida - Suspensión concentrada

Ficha Técnica



## Características:

Pronto es un herbicida sistémico selectivo post-emergente y residual de uso en el cultivo de arroz para el control de capín, ciperáceas anuales y algunas latifoliadas, que se puede aplicar desde los primeros estadios del cultivo hasta en post-emergencia tardía.

## Ventajas:

- EXCELENTE SELECTIVIDAD PARA EL CULTIVO DE ARROZ.
- MUY EFECTIVO PARA EL CONTROL DE ECHINO-CLOA SP.
- POSEE UN GRAN EFECTO RESIDUAL SIN PRODUCIR FITOTOXICIDAD A CULTIVOS DE LA ROTACIÓN.

# PRONTO

Herbicida - Suspensión concentrada

**Principio Activo:** Penoxsulam 240 g/L  
**Formulación:** Suspensión concentrada  
**Grupo Químico:** Cloroacetamida.

## Modo de acción:

Es absorbido a través de hojas, tallos y raíces, y se transloca hasta los tejidos meristemáticos. Inhibe la encima ALS, precursora de la síntesis de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina provocando la detención de crecimiento casi inmediatamente de las malezas, provocando amarillamiento y enrojecimiento de las nervaduras para luego causar la muerte de la planta.

T  
A  
B  
L  
A  
  
D  
E  
  
U  
S  
O  
S

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis	Momento de aplicación en el cultivo
	Nombre común	Nombre científico		
ARROZ ( <i>Oryza sativa</i> L.)	Capín	<i>Echinochloa crusgalli</i>	150-175 cc/ha	Post temprano. Con 2 a 3 hojas de la maleza.
	Gramilla de rastrojo	<i>Echinochola colona</i>	150 - 200 cc/ha	
	Pasto bolita	<i>Cyperus rotundus</i>		
	Ciperus	<i>Cyperus esculentus</i>		
	Gramilla dulce	<i>Paspalum distichum</i>	150 - 175 cc/ha	Maleza en activo crecimiento. Aplicar en condiciones de buena humedad e inundar en forma permanente 5-10 días después de aplicado.

- Es importante que haya buena humedad en el suelo al momento de la aplicación.
- Debe inundarse el cultivo antes de los 5 días post aplicación para maximizar su eficacia.
- Puede usarse en mezcla con Gramanex (Cyhalofop-butil), Clomanex (Clomazone), Capinex (Quinclorac).

**Tiempo de espera:** Arroz: 60 días.

## Capinex

Quinclorac 50 o 250 g/L

## Gramanex

Cyhalofop-butil 285 g/L

## METAMIFOP TAFIREL

Metamifop 200 g/L



Ruta Nacional 101, km 24,500,  
Canelones Uruguay.  
Tel.: 598 2 683 8815  
www.tafirel.com



# TAFIREL

Descargá nuestro catálogo

