

Firma registrante:
La Forja S.A.
Ruta Nacional 101,
km 24,500,
Canelones Uruguay.
Tel.: 598 2 683 8815
www.tafirel.com

Empresa Certificada.
ISO 9001:2015
LSQA N°: 1559/01

KILLER 5 EC

Contenido neto: 5 L
Fecha de Vto.: 12/07/2025
N° de Lote: 12072025
Origen: India
DGSA REG N° 3891

Lambda - Cialotrina 50 g/L Insecticida - Concentrado emulsionable



TAFIREL

Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Piretroides. **Instrucciones de almacenamiento:** **PRODUCTO NO INFLAMABLE.** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calavera)". **Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** **KILLER 5 EC** es un insecticida piretroides sintético de amplio espectro y alto poder de volteo que actúa sobre las plagas por contacto e ingestión, presentando un buen efecto residual. Lambda cialotrina es muy activa a bajas dosis logrando excelentes resultados sobre una amplia gama de insectos. Tiene actividad ovicida y adulticida.

Instrucciones de uso y dosis:

Cultivo o sitio de aplicación	Plagas		Dosis	Momento de aplicación	
	Nombre común	Nombre científico			
SOJA (Glycine max L.)	Lagarta de las leguminosas	Anticarsia gemmatilis	120 cc/ha	Aplicar de acuerdo a la densidad y estado de la plaga, el nivel de enemigos naturales y el estado fenológico del cultivo.	
	Lagarta del girasol	Rachytia ru			
	Barrenador del brote	Epinotia aporena	150 cc/ha		
	Chinche verde pequeña	Nasuta viridis	100 - 150 cc/ha		
Chinche verde	Piezodorus guildini				
TRIGO (Triticum aestivum L.)	Lagarta de los cereales	Pseudaletia autotata	120 cc/ha	Utilizar las dosis más elevadas en condiciones más desfavorables, cultivos más desarrollados o ataques más severos.	
CEBADA (Hordeum vulgare L.)	Pulgón de la espiga	Sitobium avenae	125 cc/ha		
MAÍZ (Zea mays L.)	Lagarta cogollera	Spodoptera frugiperda	200 cc/ha	Al inicio del ataque, a lagartas pequeñas y cuando se empiezan a ver hojas rasgadas. Después de la emergencia del cultivo. Cuando se alcanza el nivel de daño económico.	
	Lagarta cortadora	Agrilus ipsilon	125 cc/ha		
SOJA (Glycine max L.)	Lagarta patatera	Dichoplusia patens	240 - 280 cc/ha	Comenzar las aplicaciones cuando se observen 8 a 10 ninfas saltadoras.	
MAÍZ (Zea mays L.)	Lagarta patatera	Dichoplusia patens			
Cultivo o sitio de aplicación	Plagas		Dosis de producto	Cantidad de agua/ha	Momento de aplicación
	Nombre común	Nombre científico			
MANZANA (Malus domestica) (Sudov) (Borki) PERA (Pyrus communis L.)	Gusano de las peras y las manzanas	Carpocapsa pomonella	30 cc/100 L	1,500 - 2,000	Iniciar tratamiento a la caída de pétalos.
TOMATE (Solanum lycopersicon L.)	Pollita del tomate	Tuta absoluta	60 cc/100 L	L/ha	
					Cuando se detecta la plaga y alcance los umbrales de daño económico.

PROHIBIDA SU APLICACIÓN 2 DÍAS ANTES Y DURANTES LA FLORACIÓN PARA SOJA, FRUTALES DE HOJA CADUCA, TOMATE. Número, frecuencia, o espasmo de aplicaciones al conde: Una aplicación por temporada. **Compatibilidad y fitotoxicidad:** En general es compatible con los insecticidas y fungicidas. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronomía o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. No es fitotóxico si las dosis recomendadas. **Tiempo de espera:** Tomate: 5 días; Maíz: 21 días; Cebada: 28 días; Trigo: 30 días; Soja: 20 días; Manzana y pera: 21 días. **Tiempo de reintegro al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **Modo de preparación y técnica de aplicación:** Se prepara una pre-mezcla con la cantidad de producto necesario. Luego se vierte en el tanque de la máquina lleno hasta la mitad con agua y con los agitadores en marcha. Completar el resto del agua. Mantener los agitadores en marcha durante la aplicación. En pulverización con pulverizadora de mochila o equipos terrestres. Las dosis indicadas se refieren a pulverizaciones de alto volumen o a punto de goteo. Se recomiendan volúmenes de 80 a 120L/ha. En aplicaciones aéreas, los

volúmenes a utilizar son de 10 a 30 L/ha. Aplicar con temperatura menor a 30°C, humedad relativa mayor a 55% y velocidad del viento menor a 18km/h. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. **Antídoto:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión, NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavado a chorro de los ojos con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, lavar la piel afectada con abundante agua. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto. En caso de intoxicación, llamar al CIAT teléfono 21722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase. **Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** Medidas generales para protección del medio ambiente: Aplicaciones foliares: evitar deriva. Usar técnicas de aplicación que disminuyan la deriva (tipos de boquilla, altura de la barra de aplicación, velocidad de aplicación, volumen de aplicación) y evitar aplicaciones en condiciones climáticas que aumenten las posibilidades de la misma. No lavar ni vaciar equipos de pulverización en lagos, ríos, otras fuentes de agua, o en la cercanía de los mismos. ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. La protección de los polinizadores y en particular de la abeja es necesaria para la producción sostenible de alimentos y en varios cultivos está asociada a mayores cosechas. Peligrosidad en función de las toxicidades: Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: Altamente tóxico. Medidas de mitigación: No sembrar en áreas de desagües y surcos de erosión. No sembrar a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 metros en aplicaciones terrestres y 30 metros aplicaciones aéreas. No lavar las sembradoras en lagos, ríos y otras fuentes de agua, ni en la cercanía de los mismos. Toxicidad para abejas: Altamente tóxico. Toxicidad para organismos de suelo (lombrices): Ligeramente tóxico. Medidas de mitigación: Aplicaciones foliares: Utilizar solo en cultivos con cobertura foliar o en ambientes controlados donde la deriva al suelo sea mínima. **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfure el envase para evitar su reutilización. Trasladar los envases con Triple Lavado al centro de recolección más cercano.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR AL CIAT TELÉFONO 21722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTA. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. USO AGRÍCOLA. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO SI EXISTE) ANTES DE USAR EL PRODUCTO. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA.

Nota: LA FORJA S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenamiento, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: GSP Crop Science Private Limited.



CLASE II (DOS)
MODERADAMENTE PELIGROSO
IPCS/OMS/2019



NOCCIVO

