Carbenzate 500

FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA







CARACTERÍSTICAS:

CARBENZATE 500 es un funguicida sistémico de amplio espectro de acción que actúa por contacto, de acción preventiva y curativa en las primeras fases de infección. Posee excelente adherencia al follaje.

VENTAJAS:

- POR SU BUEN PODER SISTÉMICO Y ADHERENCIA, CULTIVOS COMPLETAMENTE PROTEGIDOS.
- BUENA EFICACIA PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE FIN DE CICLO.
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO EN MEZCLA CON TRIAZOLES.

LA FORJA S.A.
Empresa con sistema de gestión en calidad certificada
LSQA CERTIFICADO CERTIFICATE
ISO 9001:2015 REG. 1559/01

TAFIREL

Carbenzate 500

PRINCIPIO ACTIVO: Carbendazim 500 g/L

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada

GRUPO QUÍMICO: Bencimidazol

INFORMACIÓN EXTRA:

No mezclar con preparados alcalinos, ni con formulaciones oleosas u oleofosforadas.

MODO DE ACCIÓN:

Ingresa a las plantas a través del follaje y raíces, y se transloca de forma acrópeta por el resto de la planta. Inhibe la síntesis de la beta-tubulina que es esencial para la división celular, por lo que las células detienen su multiplicación terminando en una detención del crecimiento del micelio, dificultando la formación de los apresorios y de esta forma evitando que se produzca la enfermedad.

TIEMPOS DE ESPERA:

Citrus: 21 días
Arroz, Trigo y Soja: 35 días

TAMBIÉN CONFÍE EN:

Alezate
TEBUZATE 43 SC
Fluzate 80 WDG
PICOXCY

TABLA DE USOS:

INSTRUCCIONES DE USO:			
Cultivos	Enfermedad		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
Limón *(Citrus x limón (L.) Osbeck)* **Naranja** *(Citrus sinensis (L.) Osbeck)* **Mandarina** *(Citrus reticulata var. Clementine)* **Pomelo** *(Citrus grandis (L.) Osbeck)*	Sarna	*Sphaceloma fawcetti*	100 cc/100lts de caldo
Arroz *(Oryza sativa)*	Podredumbre del tallo Podredumbre de la vaina	*Sclerotium oryzae* *Rhizoctonia oryzae sativae*	800 cc/ha
Trigo *(Triticum aestivum)*	Golpe blanco	*Fusarium graminearum*	300-500 ccha
Soia *(Glycine max)*	Septoriosis Roya asiática	*Septoria glycines* *Phakospora pachyrhizi*	500 cc/ha



Momento, Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:

CITRUS: Botón floral, caída de pétalos y 20 días después.
ARROZ: Al hinchado de la espiga y a la emergencia de la panoja. En caso de ataque muy severo puede ser combinado con otro fungicida de modo de acción diferente (TEBUZATE).
TRIGO: Preventivamente en 50% de floración. En caso de ataque severo puede ser combinado con TEBUZATE u otros triazoles.
SOJA: Septoriosis: Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.
Roya asiática: Aplicar a la aparición de los primeros síntomas.
Limitar el número de aplicaciones a no más de 2 a 3 aplicaciones por temporada.