

Clorpirifos Tafirel

FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA



CARACTERÍSTICAS:

Es un insecticida fosforado que actúa por contacto, ingestión e inhalación. Posee un amplio espectro de acción, controlando insectos de varias familias en cultivos extensivos, hortícolas, frutales y cítricos. A su vez, tiene la capacidad de penetrar en los tejidos vegetales, lo que le otorga un poder residual que oscila entre 15 a 20 días.

VENTAJAS:

- ✓ POTENTE HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE INSECTOS DIFÍCILES
- ✓ AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
- ✓ ACCIÓN TANTO FOLIAR COMO EN SUELO



Clorpirifos Tafirel

PRINCIPIO ACTIVO: Clorpirifos 480g/L

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

MODO DE ACCIÓN:

El insecticida actúa por contacto, ingestión e inhalación, inhibiendo a la enzima acetilcolinesterasa causando así un envenenamiento por colapso del sistema nervioso del insecto, resultando en una hiperexcitación, parálisis y muerte.

INFORMACIÓN EXTRA:

No debe ser mezclado con productos de reacción alcalina.

TIEMPOS DE ESPERA:

Soja: 45 días. Cereales: 30 días.
Cebolla, Naranja, Limonero y Papa: 21 días.

TAMBIÉN RECOMENDAMOS:

**BIFENTRIN
TAFIREL**

DHYNO

Geonex

RHINO

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivos	CUADRO DE USOS		Dosis
	Plagas		
	Nombre común	Nombre científico	
Soja (Glycine max L.)	Epinotia	<i>Crociosema aporema</i>	1000 - 1200 cc/ha
	Lagarta de las leguminosas Lagarta del girasol	<i>Anticarsia gemmatalis</i> <i>Rachiplusia nu</i>	600 - 700 cc/ha
Trigo (Triticum aestivum L.) Cebada (Hordeum vulgare L.)	Pulgón verde de los cereales	<i>Schizaphis graminum</i>	300 - 350 cc/ha
Maíz (Zea mays L.) Sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench.)	Lagarta cogollera	<i>Spodoptera rugiperda</i>	1000 -1200 cc/ha
	Mosquita del sorgo	<i>Stenodiplosis sorghicola</i>	300 - 350 cc/ha
Cebolla (Allium cepa L.)	Trips de la cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	100 CC/100 L
Naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck) Limón (Citrus x limon (L.) Osbeck)	Pulgón negro de los citrus	<i>Toxoptera citricidus</i>	100cc/100 L
Papa (Solanum tuberosum L.)	Pulgón verde	<i>Myzus persicae</i>	500 cc/ha
	Lagartas cortadoras Lagarta cortadora saucia Bicho torito	<i>Agrotis spp.</i> <i>Peridroma saucia</i> <i>Diloboderus abderus</i>	1000 -1500 cc/ha
	Pulguilla del tabaco	<i>Epitrix fasciata</i>	2300 - 2500 cc/ha

