

Clorymex

FICHA TÉCNICA

HERBICIDA



CARACTERÍSTICAS:

Es un herbicida del grupo de los inhibidores de la ALS, para el control de malezas de hoja ancha en post emergencia en el cultivo de soja y praderas. Es más efectivo sobre las malezas pequeñas y en activo crecimiento.

VENTAJAS:

- ✓ PRACTICIDAD DEBIDO AL USO DE BAJAS DOSIS POR HECTÁREA Y UNA FORMULACIÓN DE ALTA CONCENTRACIÓN.
- ✓ PRODUCE EL CESE DE CRECIMIENTO DE LAS MALEZAS DE MANERA CASI INMEDIATA.
- ✓ SINERGIA COMPROBADA CON SULFENEX PARA CONTROL DE CONYZA EN BARBECHOS.



Clorymex

PRINCIPIO ACTIVO: Clorimuron etil 75 %

FORMULACIÓN: Granulado dispersable

GRUPO QUÍMICO: Sulfonilureas

INFORMACIÓN EXTRA:

No aplicar CLORIMEX 75% WDG en suelos de PH 6,8 – 7,8 o mayores, ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que le siguen en la rotación. Las dosis más altas pueden producir clorosis y detención temporaria en la soja, sin consecuencias en el rendimiento.

No aplicar insecticidas organofosforados entre las dos semanas previas o posteriores a la aplicación ya que se reduce la selectividad del herbicida.

MODO DE ACCIÓN:

Actúa inhibiendo la acción de la enzima acetolactato sintetasa (ALS), precursora de síntesis de los aminoácidos alifáticos de cadena ramificada, valina, leucina e isoleucina, impidiendo de esta manera la división celular y por consiguiente el crecimiento de las malezas susceptibles. Las malezas se vuelven cloróticas a los 3-5 días de aplicado y se produce necrosis en los puntos de crecimiento. La muerte ocurre entre 7 a 21 días después de aplicado.

TIEMPOS DE ESPERA:

Deben respetarse 65 días entre la aplicación y la cosecha de la soja o la utilización de la alfalfa como forraje de pastoreo o corte para silo o fardo. No pastorear praderas antes de los 30 días de la aplicación.

TAMBIÉN CONFÍE EN:

Conex
84 WDG

CLORANSULEX

GREENEX
80 WDG

TABLA DE USOS

CUADRO DE USOS			
Cultivos	Malezas controladas		Dosis (g/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
SOJA (Glycine max L.)	Yerba carnícera	<i>Conyza bonariensis</i> <i>Conyza sumatrensis</i>	15 - 20 g/ha
	Yuyo colorado Verdolaga Mastuerzo	<i>Amaranthus quitensis</i> <i>Portulaca oleracea</i> <i>Coronopus didymus</i>	
Pasturas de Gramíneas: (Con Trébol blanco - Trifolium pratense y/o Trébol rojo - Trifolium repens)	Manzanilla	<i>Anthemis cotula</i>	7 - 8 g/ha
FESTUCA (Festuca arundinacea L.)	Enredadera	<i>Ipomoea grandiflora</i>	
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	9 - 12 g/ha
RAIGRÁS (Lolium multiflorum L.)	Nabo silvestre	<i>Brassica campestris</i>	
	Hierba de gato	<i>Stachys arvensis</i>	9 - 12 g/ha
ALFALFA (Medicago sativa)	Mostacilla	<i>Rapistrum rugosum</i>	
	Rábano	<i>Raphanus raphanistrum</i>	9 - 12 g/ha
	Biznaguilla	<i>Ammi majus</i>	
	Girasol guacho	<i>Helianthus annuus</i>	

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN:

No aplicar en cultivos sometidos a estrés por condiciones de clima o sequía. No aplicar CLORYMEX 75% WDG en suelos de pH 6,8 – 7,8 o mayores, ya que el producto tendrá una residualidad mayor, pudiendo afectar a los cultivos que le siguen en la rotación. No aplicar si se espera que llueva dentro de las 4 horas siguientes a la aplicación.

1_Post-emergencia del cultivo, después de la aparición de la primera hoja trifoliada y no más de 4 hojas de las malezas.

2_Después de segunda hoja trifoliada de las leguminosas.

3_No antes de la quinta hoja trifoliada y no antes de 6 días después de una helada fuerte.

