

Folpet Tafirel

FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA



CARACTERÍSTICAS:

FOLPET TAFIREL es un fungicida orgánico preventivo con acción de contacto. Posee un amplio espectro de acción y puede ser utilizado en montes frutales y viñedos, así como en un gran número de cultivos de hortalizas para el control de enfermedades como la sarna, oídio, Mildiú, antracnosis y botritis.

VENTAJAS:

- ✓ PREVENTIVO PARA UN AMPLIO ESPECTRO DE ENFERMEDADES FÚNGICAS
- ✓ POR SU MODO DE ACCIÓN MULTISITIO, ES IDEAL PARA PREVENIR APARICIÓN DE RESISTENCIAS
- ✓ GRAN ADHERENCIA AL FOLLAJE



Folpet Tafirel

PRINCIPIO ACTIVO: Folpet 80%

FORMULACIÓN: Granulado dispersable

GRUPO QUÍMICO: Ftalamida

INFORMACIÓN EXTRA:

No se recomienda su mezcla con aceites

MODO DE ACCIÓN:

Es un fungicida multisitio o de acción múltiple, que actúa en diferentes sitios de acción en los hongos que controla, lo cual previene la aparición de razas resistentes. Interfiere en la producción de enzimas en el metabolismo del hongo, inhibiendo su respiración.

TIEMPOS DE ESPERA:

Manzana, pera, pepino, sandía, zapallo y melón: 1 día; Vid: 20 días para vinificar; Cebolla: 7 días.

TAMBIÉN CONFÍE EN:

Captan Tafirel

MANCOZATE

ZIRAM Tafirel

**Azufrate
80 DF**

TABLA DE USOS:

INSTRUCCIONES DE USO:			
Cultivos	Enfermedad		Dosis grs/lts
	Nombre común	Nombre científico	
MANZANO (<i>Malus domestica</i>)	Sarna	<i>Venturia inaequalis</i> <i>Venturia pyrina</i>	150-180 g/L
PERAL (<i>Pyrus communis</i>)	Oídio	<i>Podosphaera leucotricha</i>	
VID (<i>Vitis spp.</i>)	Oídio	<i>Uncinula necator</i>	150-180 g/L
	Erinosis de la vid	<i>Colomerus vitis</i>	
ZAPALLO (<i>Cucurbita máxima</i>)	Oídio	<i>Uncinula necator</i>	150-300 g/L
SANDÍA (<i>Citrullus lanatus</i>)			
MELÓN (<i>Cucumis melo</i>)			
PEPINO (<i>Cucumis sativus</i>)			
CEBOLLA (<i>Allium cepa</i>)	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	150-300 g/L
VIVEROS FORESTALES	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	125 g/100 L de agua

MOMENTO DE APLICACIÓN:

(1) Comenzar las aplicaciones, en el estado de verde a pimpollo rosado y continuar con el calendario indicado. (2) Comenzar las aplicaciones, en el estado de pimpollo rosado y continuar con el calendario indicado. (3) Preventivamente, cada 7 a 10 días, después que la brotación alcance 5 a 7 cm. (4) Desde comienzos de brotación, cada 7 a 10 días. (5) Desde comienzos de brotación, cada 14 días. (6) Comenzar las aplicaciones desde primera hoja verdadera y repetir cada 7 a 10 días según infestación. (7) Aplicar preventivamente y repetir semanalmente hasta que seque la parte aérea. (8) Aplicar preventivamente cuando se observe la marchitez en el ápice de las plantas con intervalos de 15-20 días. No realizar más de 2 aplicaciones por ciclo de cultivo

MANZANO: En pre floración. **PERAL:** En pos floración. **VID, Oídio:** En brotación, durante floración y antes del envero. **VID, Erinosis de la vid:** Al aparecer los primeros síntomas. **ZAPALLO, SANDÍA, MELÓN, PEPINO:** Desde que se inicia la brotación.

