

FOSFURO DE ALUMINIO TAFIREL

EXTREMADAMENTE PELIGROSO

VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA PROFESIONAL

USE TODO EL EQUIPO DE PROTECCION PARA MANIPULAR EL ENVASE Y PARA APLICAR



ALMACENE LOS PRODUCTOS EN UN LUGAR SEGURO Y VENTILADO Y NO PERMITA LA ENTRADA DE NIÑOS NI PERSONAS IRRESPONSABLES



DESPUÉS DE LA APLICACIÓN NO COMER, BEBER NI FUMAR, ANTES DE LAVARSE

LAVE EL EQUIPO LUEGO DE USARLO



UNA VEZ VACIADO SU CONTENIDO, INUTILICE EL ENVASE PARA QUE NO SEA REUTILIZADO.

NO CONTAMINAR FUENTES DE AGUA CON RESTOS DE PRODUCTO O EL LAVADO DE ENVASES O DE LOS EQUIPOS DE APLICACION



•PRIMEROS AUXILIOS

•Si a pesar de tomar las anteriores precauciones se producen intoxicaciones, se recomienda:

- 1) En caso de ingestión PROVOCAR EL VOMITO introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta
- 2) En caso de contacto con los ojos, LAVARDO A CHORRO CON AGUA LIMPIA DURANTE 15' MANTENIENDO LOS PÁRPADOS SEPARADOS.
- 3) En caso de contacto con la piel LAVADO DE LAS PARTES AFECTADAS CON ABUNDANTE AGUA O AGUA Y JABÓN. QUITAR LAS ROPAS CONTAMINADAS Y LAVARLAS ANTES DE VOLVERLAS A USAR.
- 4) NO APLICAR EN ESPACIOS HABITADOS O COLINDANTES
- 5) EN CASO DE SER NECESARIO EL INGRESO A LOCALES DE ALMACENAMIENTOS TRATADOS, ES NESECARIO EL USO DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA. LAS MÁSCARAS CON FILTROS PARA VAPORES ORGÁNICOS NO SON EFECTIVAS COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TEL: (02)1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase. EL PRODUCTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE CARTILLA PARA MÉDICOS

CONTRAINDICACIONES:

- 1) Evítese que la tableta entre en contacto con agua porque existe peligro de autoignición.
- 2) No produce reacciones químicas con las mercaderías fumigadas. Puede no obstante reaccionar con algunos metales tales como cobre, oro y plata, sobre todo a temperaturas y humedades elevadas.

