

# MANCOZATE

FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA



## CARACTERÍSTICAS:

MANCOZATE es un fungicida orgánico, de contacto, que actúa en forma preventiva para un amplio rango de hongos fitopatógenos. Utilizado en la mayoría de cultivos hortícolas, frutícolas y en viñedos.

## VENTAJAS:

- ✓ AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
- ✓ EXCELENTE HERRAMIENTA ANTI-RESISTENCIAS
- ✓ IDEAL PARA EL CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES



# MANCOZATE

**PRINCIPIO ACTIVO:** Mancozeb 80%

**FORMULACIÓN:** Granulado dispersable

**GRUPO QUÍMICO:** Carbamato

## INFORMACIÓN EXTRA:

Al ser de contacto es recomendable cubrir la totalidad de los brotes, frutos, y hojas antes de que aparezcan las enfermedades en el cultivo.

Tener en cuenta que al no poseer sistema, los brotes nuevos quedarán expuestos a enfermedades, por lo que se recomienda repetir aplicaciones de 7 a 10 días.

## MODO DE ACCIÓN:

actúa por contacto entre el fungicida y las esporas del hongo sobre la superficie del cultivo. Este principio activo posee un modo de acción multisitio, ya que interfiere en varios procesos del metabolismo del hongo, como en la producción de lípidos, en la respiración y en la generación de ATP.

## TIEMPOS DE ESPERA:

7 días en papa, tomate, cebolla y vid, 10 días en manzanos, 14 días en citrus y pera, 21 días en durazneros.

## TAMBIÉN CONFÍE EN:

**Azufrate 80 DF**  
**Captan Tafirel**  
**Folpet Tafirel**  
**ZIRAM Tafirel**

## TABLA DE USOS:

| INSTRUCCIONES DE USO:                                                                                                                                                                                                      |                                        |                                                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Cultivos                                                                                                                                                                                                                   | Enfermedad                             |                                                             | Dosis grs/100L |
|                                                                                                                                                                                                                            | Nombre común                           | Nombre científico                                           |                |
| Manzano<br>( <i>Maius doméstica</i> (Suckow)Borkn)<br>Pera<br>( <i>Pyrus communis</i> L.)                                                                                                                                  | Sarna                                  | <i>Venture insequals</i> y<br><i>v. pinna</i>               | 200 - 250      |
| Vid ( <i>Vitis vinifera</i> L.)                                                                                                                                                                                            | Mildiu                                 | <i>Plasmopara viticola</i>                                  | 250            |
| Limonero<br>( <i>Citrus xAmón</i> (L.) Osbeck),<br>Mandarino<br>( <i>Citrus reticulata</i> var <i>Clementine</i> ),<br>Naranja<br>( <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck),<br>Pomelo<br>( <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck) | Sarna                                  | <i>Sphaceloma fawcetti</i>                                  | 250            |
|                                                                                                                                                                                                                            | Antracnosis                            | <i>Colletotrichum giososporoides</i>                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                            | Melanosia                              | <i>Diaporthe citri</i>                                      |                |
| Duraznero<br>( <i>Pronuspérsica</i> (L.) Batsch),<br>Ciruelo<br>( <i>Pronusdoméstica</i> L.)<br>Pelones<br>( <i>Pronus pérsica</i> var. <i>nectarine</i> )                                                                 | Mal de chumbo<br>Podredumbre<br>morena | <i>Coryneum carpophilum</i><br><i>Monilinia fruticicola</i> | 200            |
| Membrillero<br>( <i>Cydonia oblonga</i> P. Miler)                                                                                                                                                                          | Mancha ocular                          | <i>Entomosporium macwatun</i>                               | 200            |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosu</i> L.)<br>Tomate<br>( <i>Solanum lycopersicum</i> L.)                                                                                                                                       | Tizón temprano                         | <i>Alternane solar</i>                                      | 200 - 250      |
| Cebolla<br>( <i>Adium cepa</i> L.)                                                                                                                                                                                         | Mildiu                                 | <i>Peronospora destructor</i>                               | 200 - 250      |

**Momento, Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde:**

- 1 Aplicar durante el período de punta verde a fruta formada (2 cm. de diámetro) cada 7-10 días según condiciones climáticas. Se efectúan luego pulverizaciones de cobertura cada 14 días a las dosis menores.
- 2 Aplicar cuando los brotes tienen 10 cm de largo, repitiendo cada 7-10 días según condiciones climáticas o servicio de alarma.
- 3 Aplicar en botón floral, cuando ha caído las 2/3 partes de los pétalos y 20 días después.
- 4 Aplicar desde botón floral hasta cuajado, cada 7 días.
- 5 Aplicar desde inicio de brotación cada 7-10 días hasta 10 días antes de la cosecha.
- 6 Aplicar cuando las plantas tienen 15 cm de altura y se repite cada 7-10 días según condiciones climáticas.
- 7 Aplicar cada 7-10 días.

