

METRIBUZIN TAFIREL

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS:

METRIBUZIN TAFIREL es un herbicida selectivo y residual que puede aplicarse en forma pre emergente o post emergente para el control de malezas anuales latifoliadas y algunas gramíneas. Puede ser utilizado en los cultivos de soja, papa, caña de azúcar, alfalfa, zanahoria y tomate.

VENTAJAS:

- ✓ AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
- ✓ COMBINA RESIDUALIDAD CON ACCIÓN DE CONTACTO
- ✓ DIFERENTE MODO DE ACCIÓN A HERBICIDAS RESIDUALES COMÚNMENTE UTILIZADOS EN SOJA



METRIBUZIN TAFIREL

PRINCIPIO ACTIVO: METRIBUZIN 480 G/L

FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA

GRUPO QUÍMICO: TRIAZINA

MODO DE ACCIÓN:

Es rápidamente absorbido por las raíces y translocado por el xilema al resto de la planta, en cambio si la absorción es foliar, la translocación es más limitada. Actúa inhibiendo el transporte de electrones en el Fotosistema II. Los síntomas comienzan a verse a la semana de la aplicación, apreciándose clorosis en márgenes de hojas nuevas y ápices foliares.



INFORMACIÓN EXTRA:

METRIBUZIN TAFIREL se degrada en el suelo al cabo de 90 – 100 días, por lo tanto, no existe riesgo de fitotoxicidad para cultivos posteriores.

Para un mayor control de malezas difíciles como Conyza y Amaranthus se recomienda su mezcla con Sulfenex o Paraquat Tafirol en aplicaciones de pre emergencia.

Es fundamental la presencia de humedad en el suelo para una mejor absorción por parte de las malezas.

TIEMPOS DE ESPERA:

Papa, Tomate y Zanahoria: 60 días, Soja: 90 días, Caña de Azúcar: 120 días, Alfalfa: 30 días para corte o pastoreo.

CUADRO DE USOS

Cultivos	Malezas controladas		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
PAPA (Solanum tuberosum L.)	Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	0.75 – 1.5
	Pasto cuaresma	<i>Portulaca oleracea</i>	
TOMATE (Solanum lycopersicum L.)	Verdolaga	<i>Coronopus didymus</i>	*
	Mastuerzo	<i>Digitaria sanguinalis</i>	0.45
	Spergula	<i>Spergula arvensis</i>	
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>	**
	Manzanilla	<i>Anthemis cotula</i>	0.75 – 1.1
SOJA (Glycine max)	Yuyo Colorado	<i>Rumex crispus</i>	
ZANAHORIA (Daucus carota L.)	Lengua de vaca	<i>Raphanus raphanistrum</i>	0.45 - 0.75
CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum L.)	Mostacilla	<i>Amaranthus quitensis</i>	
	Yuyo colorado	<i>Amaranthus palmeri</i>	1.5 – 3.6
	Amarantus	<i>Echinochloa crusgalli/</i>	
ALFALFA (Medicago sativa)	Capín	<i>Echinochloa colona.</i>	1.1 – 1.4
	Brachiaria	<i>Brachiaria platyphylla</i>	

MOMENTO DE APLICACIÓN:

PAPA: Aplicar antes de emerger los brotes.

TOMATE:

* Utilizar esta dosis inmediatamente después de la siembra.

** Aplicar inmediatamente después del trasplante, cuando las plantas han arraigado. No usar en suelos arenosos, ni en invernáculo o bajo plástico.

SOJA: Premergencia. Utilizar la dosis menor en suelos francos y la dosis mayor en suelos pesados. No usar en suelos arenosos.

ZANAHORIA: Cuando la zanahoria tenga de 4 a 6 hojas verdaderas.

CAÑA DE AZÚCAR: Antes de retoñar en pre emergencia, o post emergencia temprana de las malezas.

ALFALFA: Desde un año de establecida.

Utilizar la dosis menor en suelos francos y la dosis mayor en suelos pesados. En suelos arcillosos o con elevado contenido de materia orgánica, se deben aumentar las dosis.

TAMBIÉN RECOMENDAMOS:

