

SONG EXTRA

FICHA TÉCNICA

FUNGICIDA



CARACTERÍSTICAS:

SONG EXTRA es una mezcla de fungicidas con acción sistémica, con efecto preventivo, curativo y erradicante para el control de enfermedades en varios cultivos. Presenta una muy buena persistencia en el cultivo, protegiendo por casi dos meses de la mayoría de las enfermedades.

VENTAJAS:

- ✓ EXCELENTE RESIDUALIDAD Y ACCIÓN SISTÉMICA PARA UN CULTIVO PROTEGIDO POR MÁS TIEMPO.
- ✓ POSEE UN AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN.
- ✓ COMBINACIÓN DE DOS PRINCIPIOS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA UNA MAYOR EFICACIA DE CONTROL Y MEJOR MANEJO Y PREVENCIÓN DE RESISTENCIAS.



SONG EXTRA

INFORMACIÓN EXTRA:

Soja: Aplicar cuando se detecte la enfermedad o en forma preventiva desde fin de floración.

Trigo y cebada: Aplicar tan pronto se detecte la enfermedad o condiciones predisponentes. Monitorear los cultivos periódicamente. En caso de detectarse la presencia de roya en cultivos vecinos o a nivel zonal aplicar preventivamente. Se sugiere consultar el Programa Nacional de Vigilancia para obtener información complementaria a nivel zonal.

MODO DE ACCIÓN:

El Epoxiconazol tiene efecto inhibidor de ergosterol mientras que el Piraclostrobin actúa sobre la cadena de respiración en la mitocondria.

TIEMPOS DE ESPERA:

Soja 15 días; Trigo, Cebada: 35 días

CONCLUSIONES DE ENSAYO:

Para Septoria glycines, a los 22 días de la aplicación todos los tratamientos con fungicida difieren estadísticamente del testigo absoluto logrando una disminución de la enfermedad: 53 y 60% según la dosis, similar al testigo químico de conocida eficacia T. Q.

Para Cercospora kikuchii, a los 22 días de la aplicación todos los tratamientos con fungicida difieren estadísticamente del testigo absoluto logrando una disminución de la enfermedad: 47 y 51% según la dosis, similar al testigo químico de conocida eficacia T. Q.

PRINCIPIO ACTIVO: PIRACLOSTROBIN 260 g/L + EPOXICONAZOL 160 g/L

FORMULACIÓN: SUSPENSIÓN CONCENTRADA

GRUPO QUÍMICO: ESTROBILURINA Y TRIAZOL

INFORMACIÓN DE ENSAYO

EFICACIA DEL PRODUCTO SONG EXTRA EN EL CONTROL DE ENFERMEDADES DE FIN DE CICLO Y ROYA EN SOJA.

Ubicación: Paraje Arenales, departamento de Soriano.

Productor: Establecimiento "San Antonio"

Varietal: Soja DM 5.9i **Diseño:** Parcelas al azar con cuatro repeticiones, cada parcela de 60m².

Equipo: Máquina costal a motor, equipada con válvula de presión constante regulada a dos atmósferas y con un gasto de agua de 100 lts/ha.

TRATAMIENTOS

1	SONG EXTRA SC	Piraclostrobina 266 g/l+ Epoxiconazol 160 g/l
2	TESTIGO QUÍMICO HC	Piraclostrobina 266 g/l+ Epoxiconazol 160 g/l

Detalles del ensayo.

Media del porcentaje de área foliar afectada por Septoria glycines, Cercospora kikuchii, previo, 10 y 22 días de la aplicación, por tratamiento.

		% severidad de Septoria			% severidad de Cercospora		
		4/4 previo R5-6	14/4 10dda R6	26/4 22dda R6-7	4/4 previo R5-6	14/4 10dda R6	26/4 22dda R6-7
1	TESTIGO	10	16.3 a	25 a	32	63.3 a	75 a
2	T.Q. 250cc/ha		5 b	11.7 b		30 c	40 b
3	Song Extra 250cc/ha		3.3 b	11.7 b		36.7 bc	40 b
4	Song Extra 350cc/ha		8.3 b	10 b		30 c	36.7 b

CUADRO DE USOS

Cultivos	ENFERMEDAD		Dosis (cc/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
SOJA (<i>Glycine max</i> L.)	Roya asiática Tizón de la hoja Septoria	<i>Phakopsora pachyrhizi</i> <i>Cercospora kikuchii</i> <i>Septoria glycine</i>	250 - 300
TRIGO (<i>Triticum aestivum</i> L.)	Mancha amarilla Roya anaranjada Septorios o mancha de la hoja Oídio	<i>Drechslera tritici-repentis</i> <i>Puccinia recondita</i> <i>Septoria tritici</i> <i>Blumeria graminis</i> sp. tritici	
CEBADA (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	Roya de la hoja Mancha en red Mancha en red tipo spot Mancha borrosa Escaldadura Fusariosis de la espiga Oídio	<i>Puccinia hordei</i> <i>Drechslera teres</i> <i>Drechslera teres</i> f. sp. macu <i>Bipolaris sorokiniana</i> <i>Rhynchosporium secalis</i> <i>Fusarium roseum</i> f.sp. <i>Blumeria graminis</i> f.sp.hordei	500 - 600

