

WEEDKILL

FICHA TÉCNICA
HERBICIDA



CARACTERÍSTICAS:

WEED KILL, es un herbicida selectivo de post emergencia y sistémico. Se encuentra indicado para el control de malezas de hoja ancha en pasturas de gramíneas asociadas con leguminosas y cultivos de trigo y cebada consociados a leguminosas.

VENTAJAS:

- ✓ AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN Y SELECTIVIDAD
- ✓ CON MAYOR PODER DE PENETRACIÓN A TRAVÉS DE LAS CUTÍCULAS QUE OTRAS FORMULACIONES.
- ✓ EXCELENTE CONTROL DE CARDOS



WEEDKILL

PRINCIPIO ACTIVO: 2,4 DB éster isobutílico 930 g/L
(equivalente en 2,4 DB 760 g/L)

FORMULACIÓN: Concentrado emulsionable

GRUPO QUÍMICO: Ácido Fenoxicarboxílico

INFORMACIÓN EXTRA:

A diferencia del 2,4 D, este principio activo puede ser metabolizado por las leguminosas por lo que se comporta como selectivo.

Las leguminosas van perdiendo selectividad a medida que crecen, por lo que debe aplicarse cuando tienen 2 a 3 hojas trifoliadas y no después de 5 a 6 hojas. No aplicar en floración.

MODO DE ACCIÓN:

es un herbicida hormonal mimetizador de la auxina, por lo que se interfiere la síntesis proteica y de ADN, causando malformaciones y detención del crecimiento.

TIEMPOS DE ESPERA:

45 días. En campos de pastoreo con malezas tóxicas (mío-mío, etc.), retirar el ganado por 20-25 días, pues el ganado podría comerlas por cambio de sabor en la maleza luego del tratamiento.

TAMBIÉN CONFÍE EN:


Aminopyralex


CLOPYRALEX


GREENEX
80 WDG


WEEDEXmax

CUADRO DE USOS

Cultivos	Malezas controladas		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
Pasturas de gramíneas asociadas con leguminosas	Abrojo	<i>Xanthium cavanillensii</i>	1.0 - 1.5 L/ha
	Capiquí	<i>Stellaria media</i>	
	Cardo asnal	<i>Silybum marianum</i>	
	Cardo crespo	<i>Cardus nutans</i>	
	Cardo Negro	<i>Cirsium vulgare</i>	
	Cepa caballo	<i>Xanthium spinosum</i>	
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>	
	Correhuela	<i>Convolvulus arvensis</i>	
	Chamico	<i>Datura ferox</i>	
	Diente de león	<i>Teraxacum officinale</i>	
	Enredadera	<i>Poligonum convolvulus</i>	
	Mostacilla	<i>Rapistrum spp.</i>	
	Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i>	
	Llantén	<i>Plantago lanceolata</i>	
	Nabo	<i>Brassica campestris</i>	
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>	
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>	
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	
Yuyo colorado	<i>Amaranthus quitensis</i>		
Flor de pajarito	<i>Fumaria officinalis</i>		

MOMENTO DE APLICACIÓN:

Aplicar en pasturas integradas por gramíneas únicamente, o asociadas con ciertas leguminosas como alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, lotus corniculatus.

Aplicar en estado de macollaje de las gramíneas y hasta antes del encañado y/o las leguminosas sean pequeñas, 2-3 hojas trifoliadas, excepto en floración.

