



# TAFIREL



## INSECTICIDAS

### FISIOLÓGICOS

**Rapidex**  
240 SC

**RHINO**

**Matrix 50**

**Xyfen**

**SPIROX**  
240 OD

**CINATRA**  
80 WDG

### VOLTEO

**KILLER 5EC**

**NAVEX**

**BIFENTRIN**  
TAFIREL

**CIPRODIP**  
25 EC

### ACARICIDAS

**ABATOP**  
3.6 EC

**Clortenax**

## FUNGICIDAS

### SISTÉMICOS

**Escozate**

**Carbenzate**  
500

**Tebuzate** 25  
EW

**TEBUZATE**  
80 WP

**TEBUZATE**  
43SC

### CONTACTO

**Azufrate**

**Captan**  
Tafirel

**Clorozate**  
Mancozate

**Folpet**  
Tafirel

**ZIRAM**  
Tafirel

### COMBINADOS

**MaxilGold** **BÓSPYR**

## HERBICIDAS

### TOTAL

**Improsate**

**IMPROSATE**  
**FULL K**

**Improsate**  
**GOLD**

**ImprosateMax**

**IMPROSATE 88.8**

### AMPLIO ESPECTRO

**Alfamex**  
960 EC

**Goldex**

**METRIBUZIN**  
TAFIREL

**SIMAPLEX**  
90 WDG

**ZINEX**

### GRAMINICIDAS

**Galaxyfop**  
PLUS

**Xelex**

### DESECANTE

**GLUFEX**

**DIQUAT**  
Tafirel

**PARAQUAT**  
SL

## INSECTICIDAS

| PRODUCTO                        | PRINCIPIO ACTIVO       | MODO DE ACCIÓN                                               | SISTEMIA/RESIDUALIDAD | CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABATOP 3,6 EC                   | Abamectina 3,6 %       | Activación de glutamato; Acaricida                           | translaminar/si       | Cítricos ( <b>Minador de los brotes 15 cc/100 L</b> ) Duraznero - Manzano ( <b>Arañuela roja 15 - 25 cc/100 L</b> ) Peral ( <b>Arañuela roja 15 - 25 cc/100 L</b> ) Morrón ( <b>Arañuela/Trips/Ácaro 25 - 35 cc/100 L</b> )                                                                  |
| BIFENTRIN                       | Bifentrin 20 %         | Moduladores del canal de sodio; Volteo                       | no/poco               | Cítricos ( <b>Psílido asiático10 cc/100 L</b> ) Duraznero ( <b>Grafolita15 cc/100 L</b> ) Manzano - Peral ( <b>Gusano de las peras y las manzanas 15 cc/100 L</b> ) Tomate ( <b>Mosca blanca 200 cc/ha</b> ) Papa ( <b>Pulgón verde 35 cc/ha</b> )                                           |
| CINATRA 80 WDG                  | Ciantraniliprole 80%   | Moduladores del receptor de la rianodina; Fisiológico        | no/no                 | Tomate ( <b>Mosca blanca 50 - 100 gr/ha</b> )                                                                                                                                                                                                                                                |
| CIPRODIP 25 EC                  | Cipermetrina 25%       | Moduladores del canal de sodio; Volteo                       | no/no                 | Duraznero - Manzano - Peral ( <b>Grafolita 30 - 40 cc / 100 L</b> ) Tomate ( <b>Polilla del tomate 30 - 40 cc/100 L</b> )                                                                                                                                                                    |
| CLORFENAX                       | Clorfenapir 24%        | Desacoplador fosforilación oxidativa; Acaricida              | translaminar/poco     | Cítricos( <b>Ácaros 38 cc/100 L</b> ) Tomate ( <b>Polilla del tomate 50 cc/100 L</b> )                                                                                                                                                                                                       |
| KILLER 50 EC                    | Lamda Cialotrina 5%    | Moduladores del canal de sodio; Volteo                       | no/si                 | Manzano - Peral ( <b>Gusano de las peras y las manzanas 30 cc/100 L ( 1500 - 2000 L agua)</b> ) Tomate ( <b>Polilla del tomate 60 cc/100 L</b> )                                                                                                                                             |
| MATRIX                          | Lufenuron 5%           | Inhibidor síntesis de quitina; Fisiológico                   | no/si                 | Cítricos ( <b>Minador de los brotes 150 cc/100 L</b> ) Manzano - Peral ( <b>Gusanos 200 cc/100 L</b> ) Vid ( <b>Lagartita de los racimos 200 cc/ha</b> ) Tomate ( <b>Polilla del tomate 80 cc/100 L</b> )                                                                                    |
| NAVEX <small>SIN RECETA</small> | Tiacloprid 48 %        | Modulador del receptor nicotínico de la acetilcolina; Volteo | si/si                 | Duraznero - Manzano - Peral ( <b>Gusanos y Pulgones 20 cc/100 L</b> ) Papa ( <b>Pulgones 150 - 200 cc/ha</b> )                                                                                                                                                                               |
| REPIDEX 240 SC                  | Metoxifenocide 24 %    | Agonista del receptor de ecdisona; Fisiológico               | translaminar/si       | Duraznero - Manzano - Peral ( <b>Grafolita y Carpocapsa 40 cc / 100 L (1500 L agua) - 600 cc/ha</b> ) Tomate ( <b>Polilla del tomate 50 cc/100 L</b> )                                                                                                                                       |
| RHINO 75 WDG                    | Clorantraniliprole 75% | Moduladores del receptor de la rianodina; Fisiológico        | si/poco               | Cítricos ( <b>Minador de los brotes 4 g/100 L (1500 L agua)</b> ) Duraznero - Manzano - Peral ( <b>Gusano 4,5 - 6,5 gr/100L</b> )                                                                                                                                                            |
| SPIROX                          | Spirotetramat 24%      | Inhibidor síntesis de lípidos; Fisiológico                   | si/si                 | Cítricos ( <b>0,800 - 1 L/ha</b> ) Duraznero( <b>750 - 800 cc/ha</b> ) Manzano - Peral ( <b>600 - 800 cc/ha</b> ) Vid ( <b>400 - 800 cc/ha</b> ) Tomate ( <b>200 - 400 cc/ha</b> ) Morrón ( <b>200 - 400 cc/ha</b> ) Ceolla ( <b>300 - 330 cc/ha</b> ) Hortalizas ( <b>280 - 330 cc/ha</b> ) |
| XYFEN                           | Piriproxifen 35%       | Mimético hormona juvenil; Fisiológico                        | translaminar/si       | Cítricos ( <b>Mosca Blanca 15 cc/100 L</b> ) Manzano - Peral ( <b>Piojo San José / Psilia 20 cc/100 L</b> ) Vid ( <b>Chanchito Blanco/Trips 15 - 20 cc/100 L</b> ) Tomate ( <b>Mosca Blanca 10 - 15 cc/100 L</b> ) Morrón ( <b>Trips 10 - 20 cc/100 L</b> )                                  |

## HERBICIDAS

| PRODUCTO           | PRINCIPIO ACTIVO              | MODO DE ACCIÓN                 | ESPECTRO DE CONTROL | CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALFAMEX 960 EC     | S - Metolaclor 960 g/L        | Pre emergente                  | Amplio Espectro     | Hortalizas ( <b>0,6 - 1 L/ha</b> )                                                                                                                                                                                                                |
| DIQUAT TAFIREL     | Diquat, sal dibromuro 374 g/L | Desecante                      | Total               | Frutales - Vid ( <b>Fila - Entrefila 2 - 4,5 L/ha (1 L/100 L)</b> ) Papa ( <b>2 - 3 L/ha</b> )                                                                                                                                                    |
| GALAXYFOP PLUS     | Haloxifyop p-metyl 520 g/L    | Inhibidor de ACCasa            | Gramíneas           | Frutales - Vid - Hortalizas - Tomate - Morrón ( <b>130 - 220 cc/ha</b> )                                                                                                                                                                          |
| GLUFEX 300 SL      | Glufosinato de Amonio 300 g/L | Desecante                      | Total               | Frutales - Vid ( <b>Fila - Entrefila 1 - 2,1 L/ha</b> ) Papa ( <b>1,5 - 2,1 L/ha</b> )                                                                                                                                                            |
| GOLDEX             | Oxifluorfen 240 g/L           | Pre emergente / Post emergente | Amplio Espectro     | Frutales - Vid ( <b>1,5 - 2,5 L/ha Dirigida a la base</b> ) Hortalizas ( <b>Brassicas (pre trasplante) 1 L/ha</b> ) Papa ( <b>Boniato (pre trasplante) 1,5 - 2 L/ha</b> ) Cebolla ( <b>0,4 - 0,6 L/ha (+ 2 hojas) 1 - 1,5 L/ha (TRASPLANTE)</b> ) |
| METRIBUZIN TAFIREL | Metribuzin 480 g/L            | Pre emergente / Post emergente | Amplio Espectro     | Papa ( <b>0,75 - 1,5 L/ha</b> ) Tomate - Morrón ( <b>0,45 L/ha (SD) 0,75 - 1,1 Post trasplante</b> ) Zanahoria ( <b>0,45 - 0,75 L/ha (4-6 hojas)</b> )                                                                                            |
| PARAQUAT SL        | Paraquat, Dicloruro 276 g/L   | Desecante                      | Total               | Frutales - Vid ( <b>Fila - Entrefila 1,5 - 3 L/ha</b> ) Papa ( <b>2 L/ha</b> )                                                                                                                                                                    |
| SIMAPLEX 90 WDG    | Simazina 90%                  | Pre emergente                  | Gramíneas y HA      | Frutales - Vid ( <b>2 - 3,5 kg/ha</b> )                                                                                                                                                                                                           |
| XELEX              | Cletodim 24%                  | Inhibidor de ACCasa            | Gramíneas           | Frutales - Vid ( <b>500 - 700 cc/ha</b> ) Papa ( <b>350 - 700 cc/ha</b> )                                                                                                                                                                         |

## FUNGICIDAS

| PRODUCTO        | PRINCIPIO ACTIVO                        | MODO DE ACCIÓN                              | GRUPO QUÍMICO                                       | CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escozate        | DIFENOCONAZOL 250 g/L                   | Preventivo y curativo; sistemico            | Triazol                                             | Manzano - Peral ( <b>Sarna 10-15 cc/100 L</b> ) Cítricos ( <b>sarna 20 cc/100 L</b> )                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carbenzate 500  | CARBENDAZIM 500 g/L                     | Preventivo y curatico; sistemico            | Benzimidazoles                                      | Manzano - Peral ( <b>Sarna: 50 cc/100 L</b> ) Cítricos ( <b>Sarna 100 cc/100 L</b> ) Vid ( <b>Podredumbre: 500 cc/ha</b> ) Hortalizas ( <b>Viruela: 200 -250 cc/ha</b> )                                                                                                                                                                  |
| Tebuzate 43 SC  | TEBUCONZAOLE 43 %                       | Sistémico                                   | Triazol                                             | Manzano - Peral ( <b>Sarna : 300 cc/ha</b> ) Vid ( <b>Oídio: 180 cc/ha</b> ) Papa - Tomate ( <b>Tizón temprano: 300 cc/ha</b> )                                                                                                                                                                                                           |
| Azufrate 80 DF  | AZUFRE 80%                              | Curativo; contacto                          | Inorgánico                                          | Manzano - Peral ( <b>Sarna, oidio : 300-700 g/l prefloración; 200-400 g/l post floración</b> ) Vid ( <b>Oidio, Erinosis de la vid: 200-400 g/l; brotación, floración</b> ) Hortalizas - Frutales ( <b>Zapallo, pepino, sandía, melón: oidio 200-400 g/l</b> )                                                                             |
| Captan tafiel   | CAPTAN 80%                              | Preventivo y curantiv; contacto             | Ftalimida, orgánico                                 | Manzano - Peral ( <b>Sarna: 150-160 g/l, pre-floración; sarna podredumbre amarga: 125 g/l, post-floración</b> ) Vid ( <b>Mohos gris: 2,0-2,5 kg/ha, inicio de floración</b> )<br>Frutales ( <b>torque, podredumbre parda, sarna: 150-180 g/l, desde botos a fruto coajado</b> )                                                           |
| Clorozate       | CLOROTALONIL 270 g/L                    | Preventivo, contacto                        | Cloronitrilo                                        | Manzano ( <b>Sarna: 140-200 cc/ 100 L, boton rosado y floración</b> ) Papa ( <b>Tizón: 175-240 cc/100 L</b> ) Tomate ( <b>Tizón:140-200 cc/100 L, cultivo 10 cm altura</b> )                                                                                                                                                              |
| Folpet          | FOLPET 80%                              | Preventivo; multisitio; contacto            | Ftalimida, orgánico                                 | Manzano - Peral ( <b>Sarna, oidio: 150-180 g/l; pimpollo rosado</b> ) Vid ( <b>Mildiú, oidio, Moho gris: 150-180 g/l, desde la brotación</b> )<br>Hortalizas - Frutales ( <b>zapallo, pepino, sandía, melón: oidio: 150-300 g/l, desde primera hoja verdadera; cebolla: Mildiú: 150-300 g/l</b> )                                         |
| Mancozate       | MANCOZEB 80 %                           | Preventivo; contacto                        | Carbamato                                           | Manzano ( <b>Sarna: 200-250 g/100 L, punta verde a fruta formada</b> ) Cítricos ( <b>Antracnosis, sarna, melanosis: 250 g/100 L, boton floral</b> ) Vid ( <b>Mildiú: 250 g/100 L, botones con 10 cm largo )</b><br>Papa ( <b>Tizón temprano: 200-250 g/100 L, planta de 15 cm</b> ) Hortalizas ( <b>cebolla: Mildiú:200-250 g/100 L</b> ) |
| Mancozate 75 WG | MANCOZEB 75%                            | Preventivo; contacto                        | Carbamato                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ziram           | ZIRAM 80%                               | Preventivo; contacto                        | Ditiocarbamato, orgánico                            | Cítricos ( <b>Sarna, Melanosis: 280 g/100L</b> ) Vid ( <b>Antracnosis: 280 g/100 L</b> ) Papa - Tomate ( <b>Tizón temprano: 280 g/100 L</b> ) Frutales ( <b>Torque, mal de chumbo: 330 g/100 L</b> )                                                                                                                                      |
| Maxil gold      | MANCOZEB 48%<br>+ METALAXIL 10%         | Contacto y sistémico; preventivo y curativo | Mancozeb: Ditiocarbamato; Metalaxil: Acilalanina.   | Vid ( <b>Mildiú 250 g/100 L</b> ) Papa ( <b>Tizón tardío: 250 g/100 L</b> ) Tomate ( <b>Tizón tardío: 300 - 450 g/100 L</b> ) Hortalizas ( <b>Mildiú: 200 -300 g/100 L</b> )                                                                                                                                                              |
| Bospyr          | BOSCALID 25,5<br>+ PIRACLOSTROBIN 12,8% | Contacto, sistémico y translaminar          | Boscalid: Carboxamida Piraclostrobin: Estrobirulina | Vid ( <b>Moho gris: 1,2 -1,5 kg/ha Oidio y Mildiú: 800 g/ha</b> ) Papa ( <b>Tizón temprano: 250 - 300 g/ha</b> ) Tomate ( <b>Tizón temprano; Moho gris 100 - 150 g/100 L</b> ) Frutales ( <b>Podredumbre parda 0,75 - 1 kg/ha</b> )                                                                                                       |

## AGRITECNO

| PRODUCTO          | COMPOSICIÓN                                           | FUNCIÓN                                        | APTITUD                | CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRIFUL           | N; P; K; acidos fluvicos                              | Ayuda a mejorar situaciones de estrés abiotico | Bionutriente radicular | Hortícola ( <b>3-5 l/ha; Empezar 15-21 días después del trasplante</b> ) Árboles frutales ( <b>7-10 l/ha; Del principio de la temporada hasta el final</b> )    |
| AGRIFUL antisal   | Ca; extracto húmico; acidos fúlvicos; N ; MO          | Corrector de salinidad                         | Bionutriente radicular | Hortícola ( <b>2-3 l/ha; a partir de los 10-15 días )</b> Árboles frutales ( <b>3-5 l/ha, Inicio entrada plena actividad radicular, brotación</b> )             |
| TECAMIN MAX       | Aminoacidos 14,4 p/p ; N 7% p/p                       | Activa crecimiento y desarrollo de las plantas | Bionutriente foliar    | Hortícola ( <b>2-3 l/ha; desde inicio a entrada de produccion hasta fin del ciclo</b> ) Árboles frutales ( <b>3 l/ha; en brotación y desarrollo del fruto</b> ) |
| TECNOKEL AMINO CA | Calcio 10% p/p; B 0,2% p/p; Aminoácidos libres 6% p/p | Prevención y corrección de carencias de calcio | Bionutriente foliar    | Hortícola - Árboles frutales ( <b>Deficiencia moderada: 2-3 L/ha - Deficiencia severa 3-4 L/ha.</b> )                                                           |
| TECNOKEL AMINO K  | Aminoácidos Libres “L” 5 % p/p; K2O 20 % p/p          | Corrector de carencia de potasio               | Bionutriente foliar    | Hortícola - Árboles frutales ( <b>Deficiencia moderada: 2-3 L/ha - Deficiencia severa 3-4 L/ha.</b> )                                                           |

## COADYUVANTES

| PRODUCTO           | COMPOSICIÓN                                                                                 | FUNCIÓN                                                 | APTITUD                             | DOSIS        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| ADHEREX SILICONADO | Nonil fenol etoxilado 10%<br>+ Sal sódica del lauril éter sulfato 25% + Metil siloxano 10 % | Supermojable.<br>Ideal para fungicidas e insecticidas   | Coadyuvante no iónico, tensioactivo | 50 cc/100 L  |
| ADHEREX OLEO       | Aceite de soja desgomado 94%                                                                | Mayor adherencia al follaje.<br>Ideal para insecticidas | Coadyuvante, antievaporante         | 0,5-1 L/100L |



# TAFIREL

**CATÁLOGO  
DE PRODUCTOS**



**TAFIREL.COM**



RUTA NACIONAL 101, KM 24,500 | CANELONES, URUGUAY. TEL.: (598) 2683 8815 | [TAFIREL@TAFIREL.COM](mailto:TAFIREL@TAFIREL.COM)