



TRATAMIENTO DE SEMILLA

Biogard
60FS

Triple
4000

Fertigrain
Start CoMo

Fertigrain
Start

LÍNEA IMPROSATE

Improsate

IMPROSATE
FULL K

Improsate
GOLD

ImprosateMax

IMPROSATE 88.8

HERBICIDAS

HOJA ANCHA

Aminopyralex

BASANEX
600

CLOPYRALEX

Clorymex 75 WDG

Pyclorex

Dicambex
SL

ZETAPEX70

GREENEX
80 WDG

WEEDEXmax

WEEDKILL

FLUROXYPYR
TAFIREL

METRIBUZIN
TAFIREL

HerbexMax
75% WDG

GRAMINICIDAS

Galaxyfop
PLUS

Xelex

PRE-MERGENTE

SIMAPLEX
90 WDG

DESECANTE

DIQUAT
Tafirel

PARAQUAT
SL

INSECTICIDAS

ABATOP
3.6 EC

CIPRODIP
25 EC

BIFENTRIN
TAFIREL

KILLER 5 EC



LÍNEA COADYUVANTES

Fertigrain
Foliar

Tecamin
Max

AdherexMax

Adherex
Siliconado

TRATAMIENTO DE SEMILLA

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	MODO DE ACCIÓN	APTITUD	CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)
Biogard 60 FS	Imidacloprid 600 g/l	Neonicotinoide	Curasemilla-insecticida	Avena (Bichito torito 100 cc/100 kg semilla)
Triple 4000	Carbendazim 250 g/l; Tiram 100 g/l; metalaxil 50 g/l	Neonicotinoide	Curasemilla-fungicida	Festuca - Raigras - Dactylis (Mal de almacigos: 400-500 cc/kg de semilla)
Fertigrain start CoMo	Aminoácidos; N; Materia Orgánica; Extracto de algas; Zn; Co; Mo	Promueve la fijación biológica del Nitrógeno	Bioestimulante para semilla	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (Mal de almacigos: 400-500 cc/100 kg de semilla)
Fertigrain Start	Aminoácidos; N; Materia Orgánica; Extracto vegetal;	Aumentó la tasa de germinación y la energía de crecimiento	Bionutriente Radicular	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (4-5 l de producto/tonelada de semilla)
				Festuca - Raigras - Avena - Dactylis - Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (1-2 L/ 1000 kg se semilla)

LÍNEA IMPROSATE

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	MODO DE ACCIÓN	Espectro de control	Momento de aplicación	Dosis
Improsate	Glifosato IPA 480 gr/l	ESPS	Herbicida total sistémico	Barbecho	4 - 6 L/ha
Improsate Full K	G Sal Potasica 660 gr/lt	ESPS	Herbicida total sistémico	Barbecho	2,5 - 3 L/ha
Improsate gold	G Sal Dimetilamina 480gr/lt	ESPS	Herbicida total sistémico	Barbecho	2,5 - 3 L/ha
Improsate max	G Amoniacal 75,7%	ESPS	Herbicida total sistémico	Barbecho	1 - 3 kg/ha
Improsate 88,8 SG	G Amoniacal 88,8%	ESPS	Herbicida total sistémico	Barbecho	0,8 -2,5 kg/ha

HERBICIDAS

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	MODO DE ACCIÓN	ESPECTRO DE CONTROL	CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)	MOMENTO DE APLICACIÓN
Aminopyralax	Aminopyralid, sal potasica 88,80%	Hormonal; post-emergente	Hoja ancha	Festuca - Raigras - Avena - Dactylis (12-20 g/ha)	Post-siembra; desde la tercera hoja del cultivo hasta fines de macollaje
Basanex 600	Bentazona, sal sódica 600 g/l	Inhibidor de la fotosíntesis en PSII; Post-emergente, contacto	Hoja ancha y Ciperaceas	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa (0,6-0,8 L/ha)	Post-siembra; malezas de 2-4 hojas
Clopyralax	Clopiralid, sal monoetanolamina 480 g/l	Hormonal; Post, emergente, sistémico;	Hoja ancha	Festuca - Raigras - Avena - Dactylis (80-100 cc/ha) / Lotus (1° año: 80-100 cc/ha 2° año: 100-120 cc/ha)	Post-siembra; desde la 5ta hoja del cultivo hasta fines de macollaje
Clorimex	Clorimuron etil 75%	Inhibidor ALS; post-emergente	Hoja ancha	Festuca - Raigras - Avena - Dactylis (7-8 g/ha) - Alfalfa (9-12 g/ha) / Pasturas mezcla (7-8 g/ha)	Post-siembra; Después de segunda hoja trifoliada de las leguminosas.
Dicambex SL	Dicamba, sal dimetilamina 577 g/l	Hormonal; post-emergente; sistémico	Hoja ancha	Festuca - Raigras - Avena (100-150 cc/ha)	Post-siembra; inicio del macollaje hasta antes del encañado
Diquat Tafirel	Diquat, sal dibromuro 374 g/l	Desviación de electrones en el PS I; post-emergente; contacto	Desecante	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa (2-3 L/ha)	Pre-cosecha
Fluroxypyr Tafirel	Fluroxipir-meptil 480 g/l	Hormonal ; Post-emergente; sistémico;	Hoja ancha	Festuca - Raigras - Avena - Dactylis (180-300 cc/ha)	Post-siembra
Galaxyfop plus	Haloxfop-p-metil 520 g/l	Inhibidor ACC; post-emergente; sistémico	Gramíneas anuales y perennes	Trebol blanco- Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (300-350 cc/ha)	post-siembra
Greenex	Flumetsulam 80%	Inhibidor ALS; pre-mergente; post-emergente	Hoja ancha, latifoliada, gramínea	Festuca - Raigras - Avena (60-70 g/ha/35-45 g/ha*) Trebol blanco - Trebol rojo (60-70 g/ha/35-45 g/ha*) Lotus (60-70 g/ha/35-45 g/ha*) Alfalfa (60-90 g/ha/35-45 g/ha*)	Pre-siembra (dosis altas); Post-siembra (dosis bajas)*
Herbex Max	Metsulfuron-metil 75%	Inhibidor ALS; post-emergente;	Hoja ancha	Avena (4-5 g/ha)	Post-siembra, aplicar al cultivo desde Z2.1 (macollaje) a Z3.0 (inicio de encañado)
Metribuzin Tafirel	Metribuzin 480 g/l	Inhibidor de la fotosíntesis en PSII; pre-emergente y post-emergente	Hoja ancha	Alfalfa (1,1-1,4 L/ha)	Post-siembra; Alfalfa segundo año
Paraquat tafirel	Paraquat dicloruro 276 g/l	Desviación de electrones en el PS I; post-emergente; contacto	Desecante	Trebol blanco- Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (2 L/ha)	Pre-cosecha; cosechar antes de los 5 días.
Pyclorex	Picloram, sal potasica 280 g/l	Hormonal; post-emergente; sistémico	Hoja ancha	Festuca - Raigras (75-100 cc/ha)	Post-siembra, a partir de la 3er hoja
Simaplex 90 WDG	Simazina 90%	Inhibidor de la fotosíntesis en PSII; Pre-emergente	Hoja ancha y gramíneas	Alfalfa (1,0-2,0 kg/ha)	Post-siembra; Alfalfa segundo año
Weed kill	2,4 DB ester isobutilico 930 g/l	Hormonal; post-emergente; sistémico	Hoja ancha	Pasturas mezcla (1,0-1,5 L/ha)	Post-siembra; Aplicar en estado de macollaje de las gramíneas y hasta antes del encañado y/o las leguminosas sean pequeñas, 2-3 hojas trifoliadas
Weedex max	2,4 D- sal dimetilamina 720 g/l	Hormonal; post-emergente; sistémico	Hoja ancha	Avena (0,5-1,0 L/ha)	Post-siembra; Desde Z21 hasta Z29
Xelax	Cletodim 240 g/l	Inhibidor ACC; post-emergente	Gramíneas anuales y perennes	Trebol blanco - Trebol rojo - Lotus (0,35-0,45 L/ha) Alfalfa (0,55-0,70 L/ha)	Post-siembra
Zetapex	Imazetapir 70%	Inhibidor de ALS;post-emergente; sistémico	Hoja ancha	Alfalfa (110-140 g/ha)	Pre-siembra; post-siembra a partir de la 2da hoja trifoliada o luego de un corte

INSECTICIDAS

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	MODO DE ACCIÓN	SISTEMIA/RESIDUALIDAD	CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)
Abatop	Abamectina 36 g/l	Activación de glutamato; Acaricida	translaminar/si	Festuca - Raigras - Avena - Dactylis - Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (Arañuela roja: 250 cc/ha)
Ciprodiop 25 EC	Cipermetrina 250 g/l	Modulador del canal de sodio; volteo	no/no	Trebol Blanco, Trebol rojo, Lotus (Langostas: 160-200 cc/ha) Alfalfa (Lagarta 80-100 cc/ha)
Bifentrin	Bifentrin 200 g/l	Moduladores del canal de sodio; volteo	no/baja	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa - Lotus (Lagarta de las leguminosas, arañuela, trips, pulgones: 75-100 cc/ha)
Killer 5 EC	Lambdacialotrina 50 g/l	Moduladores del canal de sodio; volteo	no/si	Alfalfa (Lagarta de la alfalfa: 50-70 cc/ha)

AGRITECNO

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	FUNCIÓN	APTITUD	CULTIVO O SITIO DE APLICACIÓN (DOSIS)
Fertigrain foliar	Aminoácidos; N; MO; Zn; Mn; B; Fe; Cu; Mo; Co	Mejora productividad y calidad.	Bionutriente foliar	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa (1-1,5 l/ha)
Tecamin max	Aminoácidos 14,4 p/p ; N 7% p/p	Activa crecimiento y desarrollo de las plantas	Bionutriente	Trebol blanco - Trebol rojo - Alfalfa (1-2 l/ha; aplicar a los 10-15 d despues de cada corte)

COADYUVANTES

PRODUCTO	PRINCIPIO ACTIVO	APTITUD	(DOSIS)	FUNCIÓN
Adherex siliconado	Nonil fenol etoxilado 10% + Sal sódica del tauril éter sulfato 25% + Metil siloxano 10 %	Coadyuvante no iónico, tensioactivo	50 cc/100 L	Supermojable. Ideal con insecticidas
Adherex max	Nonil fenol etoxilado 15% + Sal sódica del Lauril ester sulfato 15% + Ácido fosforico 15%	Coadyuvante no iónico, tensioactivo, corrector de aguas	100 cc/100L	Corrector de ph, secuestra cationes. Ideal para el uso de herbicidas

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**



TAFIREL.COM



TAFIREL

RUTA NACIONAL 101, KM 24,500 | CANELONES, URUGUAY. TEL.: (598) 2683 8815 | TAFIREL@TAFIREL.COM